

RECOMENDACIONES

-  Consultar a especialistas para el correcto diagnóstico de la plaga.
-  Seleccionar preferentemente insecticidas de banda verde.
-  Respetar el PC (periodo de carencia).
-  Realizar estrategias de manejo que incluyan alternancia de productos para evitar las resistencias a los insecticidas.

REFERENCIAS

- RG:** Riego por goteo
- AF:** Aspersión foliar
- NE:** No establecido
- SR:** Sin restricciones
- Drench:** Planta por planta

Formulaciones

- SC:** Suspensión Concentrada
- SP:** Polvo Soluble
- SL:** Concentrado Soluble
- EC:** Concentrado Emulsionable
- WG:** Granulado Dispersable
- WP:** Polvo Mojable
- CS:** Suspensión de Encapsulado
- OD:** Dispersión Oleosa
- SE:** Suspo-emulsión

INFORMES

EEA Mendoza  
San Martín 3853 - Mayor Drummond  
Luján de Cuyo - Mendoza  
Tel. 0261 - 4963020/3332  
mendoza.graciela@inta.gob.ar



INSECTICIDAS PARA LOS CULTIVOS DE  
PIMIENTO Y BERENJENA



Ing. Agr. Graciela Mendoza  
Ing. Agr. Violeta Becerra  
Tec. Agr. Javier Torres  
Ing. Agr. Valeria Longone

Proyecto Regional  
Cinturón Verde  
Mendoza



# INSECTICIDAS PARA EL CULTIVO DE PIMIENTO



| Plaga                                                                    | Principio activo                 | Form., concentr. y dosis                                                                     | PC | Modo de acción y Momento de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulgón verde del duraznero<br>( <i>Myzus persicae</i> ) y otros pulgones | Acetamiprid                      | SP 20%<br>AF 50 - 100 g/100 L de agua                                                        | 1  | <b>Sistémico, translaminar y citotrópico. Contacto e ingestión sobre ninfas y adultos.</b><br>Ante los primeros insectos en el cultivo.                                                                                                                                                                            |
|                                                                          | Azadiractina                     | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                        | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíz y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                |
|                                                                          | Clorpirifos Etil/<br>Clorpirifos | CS 25%<br>1,2 - 3,0 L/ha<br>EC 48%<br>0,6 - 1,5 L/ha                                         | 21 | <b>Cobertura. Contacto, ingestión, inhalación, con poder de volteo. Sobre adultos, ninfas y huevos.</b><br>De amplio espectro. Cuando se detecten los primeros focos de insectos en el cultivo.                                                                                                                    |
|                                                                          | Imidacloprid                     | WG 70%<br>AF 15 - 25 g/100 L de agua<br>Drench 17,5 - 30 g/10 L de agua<br>RG 500 - 750 g/ha | 3  | <b>Sistémico por raíz. Citotrópico y traslaminar. Contacto e ingestión sobre ninfas y adultos.</b><br>AF: aplicar ante la presencia de la plaga. RG: 1ª aplicación después del trasplante; 2ª aplicación 45 a 50 después. Drench: 15 cc de solución por planta. Dosis menores para altas densidades de plantación. |
|                                                                          | Metomil                          | SP 90%<br>WP 90%<br>250 - 500 g/ha<br>30 - 60 g/100 L de agua                                | 10 | <b>Sistémico. Contacto, ingestión, con poder de volteo. Sobre ninfas, adultos y huevos.</b><br>De amplio espectro de acción. Iniciar los tratamientos ante los primeros ataques.                                                                                                                                   |
|                                                                          | Pirimicarb                       | WG 50%<br>500 g/ha                                                                           | 5  | <b>Sistémico por raíces. Translaminar en hojas. Contacto, ingestión, inhalación, con poder de volteo sobre ninfas y adultos.</b><br>Aplicar al observar los primeros áfidos en las hojas.                                                                                                                          |
|                                                                          | Spirotetramat                    | SC 15%<br>AF 50 cc/100 L de agua                                                             | 2  | <b>Sistémico, translaminar. Contacto e ingestión. Sobre huevos, ninfas y adultos.</b><br>Al observar la presencia de la plaga.                                                                                                                                                                                     |

| Plaga                                                                 | Principio activo                  | Form., concentr. y dosis                                                                      | PC | Modo de acción y Momento de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arañuelas roja común<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )                | Azadiractina                      | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                         | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíz y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                 |
|                                                                       | Hexitiazox                        | WP 10%<br>30 - 50 g/100 L de agua                                                             | 7  | <b>Translaminar y citotrópico. Contacto e ingestión sobre huevos y ninfas.</b><br>Con la aparición de los primeros adultos.                                                                                                                                                                                         |
| Minador de la hoja<br>( <i>Liriomyza</i> spp.)                        | Azadiractina                      | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                         | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíz y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                 |
|                                                                       | Imidacloprid                      | WG 70%<br>AF 15 - 30 g/100 L de agua<br>Drench 17,5 - 30 g/10 L de agua<br>RG 750 - 1000 g/ha | 3  | <b>Sistémico por raíz. Citotrópico y translaminar. Contacto e ingestión sobre larvas y adultos.</b><br>AF: aplicar ante la presencia de la plaga. RG: 1ª aplicación después del trasplante; 2ª aplicación 45 - 50 después. Drench: 15 cc de solución por planta. Dosis menores para altas densidades de plantación. |
| Moscas blancas<br>( <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Trialeurodes</i> spp.) | Azadiractina                      | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                         | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíz y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                 |
|                                                                       | Imidacloprid                      | WG 70%<br>AF 15 - 30 g/100 L de agua<br>Drench 17,5 - 30 g/10 L de agua<br>RG 750 - 1000 g/ha | 3  | <b>Sistémico por raíz. Citotrópico y translaminar. Contacto e ingestión sobre ninfas y adultos.</b><br>AF: aplicar ante la presencia de la plaga. RG: 1ª aplicación después del trasplante; 2ª aplicación 45 - 50 después. Drench: 15 cc de solución por planta. Dosis menores para altas densidades de plantación. |
| Polilla del tomate<br>( <i>Tuta absoluta</i> )                        | Azadiractina                      | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                         | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíz y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre larvas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                 |
|                                                                       | Lambdacialotrina / Gamacialotrina | CS 25%<br>17 cc/100 L de agua<br>CS y EC 5%<br>85 cc/100 L de agua                            | 1  | <b>Cobertura. Con alto poder de volteo. Contacto e ingestión. Sobre huevos, larvas y adultos.</b><br>Ante los primeros ataques después del trasplante.                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia con datos de Resolución 934/10 de SENASA listado actualizado en agosto 2016. Lista de Formulados 2016 de SENASA. Resolución 608-2012 para cultivos menores de SENASA. Guía de Productos Fitosanitarios CASAFE 2011 y 2015/2017. Manual de Tratamientos Fitosanitarios para cultivos de clima templado bajo riego. Sección I: frutales de carozo, Sección II: frutales de pepita y nogal, Sección III: vid. The Pesticide Manual. 15ª Edition. \*\* a pesar de tener LMR (Res. 934/2010) para pimiento, el cultivo no se encuentra mencionado en la etiqueta del producto. Las recomendaciones consignadas corresponden a otros cultivos. **PC:** Periodo de Carencia. **Form.:** Formulación. **Concentr.:** Concentración.

INSECTICIDAS PARA EL CULTIVO DE BERENJENA



| Plaga                                                                                                              | Principio activo           | Form., concentr. y dosis                                                                      | PC | Modo de acción y Momento de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulgón de la papa<br>( <i>Macrosiphum solanifolii</i> )<br>Pulgón verde del duraznero<br>( <i>Myzus persicae</i> ) | Azadiractina               | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                         | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíz y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                 |
|                                                                                                                    | Pirimicarb                 | WG 50%<br>500 g/ha                                                                            | 5  | <b>Sistémico por raíz. Translaminar en hojas. Contacto, ingestión, inhalación, con poder de volteo sobre ninfas y adultos.</b><br>Aplicar al observar los primeros áfidos en las hojas.                                                                                                                             |
| Trips<br>( <i>Frankliniella</i> spp.)                                                                              | Imidacloprid               | WG 70%<br>AF 15 - 30 g/100 L de agua<br>Drench 17,5 - 30 g/10 L de agua<br>RG 750 - 1000 g/ha | 3  | <b>Sistémico por raíz. Citotrópico y translaminar. Contacto e ingestión sobre larvas y adultos.</b><br>AF: aplicar ante la presencia de la plaga. RG: 1ª aplicación después del trasplante; 2ª aplicación 45 - 50 después. Drench: 15 cc de solución por planta. Dosis menores para altas densidades de plantación. |
| Pulguilla<br>( <i>Epitrix argentinensis</i> )                                                                      | Deltametrina / Decametrina | EC 5%<br>30 cc/100 L de agua<br>EC 10%<br>15 cc/100 L de agua                                 | 3  | <b>Cobertura. Contacto, ingestión, con alto poder de volteo sobre larvas y adultos.</b><br>De amplio espectro de acción. Aplicar al observar los primeros daños. Repitir cada 10 días.                                                                                                                              |

| Plaga                                                                | Principio activo           | Form., concentr. y dosis                                                                      | PC | Modo de acción y Momento de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arañuelas roja común<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )               | Abamectina/<br>Avermectina | EC 1,8%<br>50 - 70 cc/100 L de agua<br>SC 8,4%<br>11 - 15 cc/100 L de agua                    | 3  | <b>Translaminar. Contacto e ingestión sobre ninfas y adultos.</b><br>Al observar los primeros ácaron en el cultivo. Dosis más alta para altas infestaciones, ante condiciones climáticas favorables para la plaga o mayor densidad foliar del cultivo.                                                          |
|                                                                      | Azadiractina               | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                         | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíces y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.           |
|                                                                      | Propargite                 | WP 30%<br>150 - 200 g/100 L de agua<br>EC 72%<br>65 - 85 cc/100 L de agua                     | 7  | <b>Cobertura. Contacto e ingestión sobre ninfas y adultos.</b><br>Iniciar los tratamientos cuando se observen 1 a 2 ácaros por hoja.                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | Pyridaben                  | EC 20%<br>WP 20%<br>50 - 75 g/100 L de agua                                                   | NE | <b>Cobertura. Contacto sobre ninfas y adultos.</b><br>Aplicar cuando se observan los primeros individuos de la plaga.                                                                                                                                                                                           |
| Minador de la hoja<br>( <i>Liriomyza</i> spp.)                       | Azadiractina               | EC 1,2%<br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                         | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíz y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.             |
|                                                                      | Imidacloprid               | WG 70%<br>AF 15 - 30 g/100 L de agua<br>Drench 17,5 - 30 g/10 L de agua<br>RG 750 - 1000 g/ha | 3  | <b>Sistémico por raíz. Citotrópico y translaminar. Contacto e ingestión sobre larvas y adultos.</b><br>AF: aplicar ante la presencia de la plaga. RG: 1ª aplicación después del trasplante; 2ª aplicación 45 a 50 después. Drench: 15 cc/planta de solución. Dosis menores para altas densidades de plantación. |
| Nematodos<br>( <i>Nacobus aberrans</i> -<br><i>Meloidogyne</i> spp.) | Fenamifos                  | CS 24%<br>13,5 - 16,5 L/ha                                                                    | 90 | <b>Sistémico por raíz. Contacto e ingestión sobre larvas y adultos.</b><br><b>Nematicida.</b> Controla también insectos chupadores. Aplicar en el RG o como drench: en la siembra, mojando bien la superficie circundante.                                                                                      |

| Plaga                                                                                                            | Principio activo                      | Form., concentr. y dosis                                                                                           | PC | Modo de acción y Momento de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moscas blancas</b><br><i>(Bemisia tabaci - Trialeurodes vaporariorum)</i>                                     | <b>Acetamiprid</b>                    | <b>SP 20%</b><br>AF 50 - 100 g/100 L de agua                                                                       | 1  | <b>Sistémico, translaminar y citotrópico. Contacto e ingestión sobre ninfas y adultos.</b><br>Ante los primeros insectos en el cultivo.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | <b>Azadiractina</b>                   | <b>EC 1,2%</b><br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                                       | SR | <b>Cobertura, sistémico por raíces y algo por hojas. Contacto e ingestión sobre ninfas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                                       |
|                                                                                                                  | <b>Cyantraniliprole - Cyazipyr</b>    | <b>OD 10%</b><br><b>SE 10%</b><br>50 - 60 cc/100L de agua                                                          | 1  | <b>Cobertura. Sistémico por raíz en almácigos o en el trasplante. Ingestión sobre ninfas.</b><br>Ante la presencia de plaga. De ser necesario repetir cada 10 - 14 días.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | <b>Imidacloprid</b>                   | <b>WG 70%</b><br>AF 15 - 30 g/100 L de agua<br><b>Drench</b> 17,5 - 30 g/10 L de agua<br><b>RG</b> 750 - 1000 g/ha | 3  | <b>Sistémico por raíz. Citotrópico y translaminar. Contacto e ingestión sobre ninfas y adultos.</b><br><b>AF:</b> aplicar ante la presencia de la plaga. <b>RG:</b> 1ª aplicación después del trasplante; 2ª aplicación 45 - 50 después.<br><b>Drench:</b> 15 cc de solución por planta. Dosis menores para altas densidades de plantación. |
|                                                                                                                  | <b>Spirotetramat</b>                  | <b>SC 15%</b><br>AF 60 cc/100 L de agua                                                                            | 2  | <b>Sistémico, translaminar. Contacto e ingestión. Sobre ninfas, adultos y huevos.</b><br>Ante la presencia de la plaga o cuando se supere el umbral de 5 ninfas/folíolo.                                                                                                                                                                    |
| <b>Gorgojo del tomate</b><br><i>(Phyrdenus muriceus)</i><br><b>Gusanos blancos</b><br><i>(Cyclocephala spp.)</i> | <b>Clorpirifos Etil / Clorpirifos</b> | <b>CS 25%</b><br>8 - 12 L/ha<br><b>EC 48%</b><br>4 - 6 L/ha                                                        | 21 | <b>Cobertura. Contacto, ingestión, inhalación, con poder de volteo. Sobre adultos, larvas y huevos.</b><br>De amplio espectro. Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos a 5 - 10 cm de profundidad.                                                                                                                            |
| <b>Gusanos cogolles-ros y cortadores</b><br><i>(Spodoptera frugiperda - Heliothis zea y otros)</i>               | <b>Carbaril</b>                       | <b>WP 85%</b><br><b>SP 85%</b><br>90 - 160 g/100 L de agua                                                         | 5  | <b>Cobertura con cierta citotropía. Contacto e ingestión sobre larvas y adultos.</b><br>De amplio espectro. Ante la presencia de la plaga.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                  | <b>Clorpirifos Etil / Clorpirifos</b> | <b>CS 25%</b><br>1 - 2,5 L/ha<br><b>EC 48%</b><br>0,5 - 1,25 L/ha                                                  | 21 | <b>Cobertura. Contacto, ingestión, inhalación, con poder de volteo. Sobre adultos, larvas y huevos.</b><br>De amplio espectro de acción. En cultivo establecido, cuando se detecten los primeros daños.                                                                                                                                     |

| Plaga                                                                             | Principio activo                      | Form., concentr. y dosis                                                                                           | PC | Modo de acción y Momento de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trips</b><br><i>(Frankliniella occidentalis - F. shultzei - Thrips tabaci)</i> | <b>Clorpirifos Etil / Clorpirifos</b> | <b>CS 25%</b><br>320 cc/100 L de agua<br><b>EC 48%</b><br>160 cc/100 L de agua                                     | 21 | <b>Cobertura. Contacto, ingestión, inhalación, con poder de volteo. Sobre adultos, larvas y huevos.</b><br>De amplio espectro. Cuando se detecten los primeros daños. Utilizar en mezcla con cipermetrina (25%): 30 cc/100 L de agua.                                                                                                    |
| <b>Trips</b><br><i>(Frankliniella spp.)</i>                                       | <b>Formetanato Clorhidrato</b>        | <b>SP 50%</b><br>150 - 200 g/100 L de agua ó 100 g + 1 kg de azúcar                                                | 3  | <b>Cobertura. Contacto e ingestión sobre larvas y adultos.</b><br><b>Trasplante:</b> con 1 trips/planta. <b>Cultivo:</b> con 1 trips por flor.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | <b>Imidacloprid</b>                   | <b>WG 70%</b><br>AF 15 - 25 g/100 L de agua<br><b>Drench</b> 17,5 - 30 g/10 L de agua<br><b>RG</b> 750 - 1000 g/ha | 3  | <b>Sistémico por raíz. Citotrópico y translaminar. Contacto e ingestión sobre larvas y adultos.</b><br><b>AF:</b> aplicar ante la presencia de la plaga. <b>RG:</b> 1ª aplicación después del trasplante; 2ª aplicación 45 - 50 después. <b>Drench:</b> 15 cc de solución por planta. Dosis menores para altas densidades de plantación. |
| <b>Polilla del tomate</b><br><i>(Tuta absoluta)</i>                               | <b>Azadiractina</b>                   | <b>EC 1,2%</b><br>200 - 400 cc/100 L de agua                                                                       | SR | <b>Cobertura. Contacto e ingestión sobre larvas.</b><br>Adecuar la dosis y la frecuencia de aplicación (de 5 a 14 días), según la presión de la plaga. Regular el pH del agua entre 5,5 - 6,5. Se pueden sumergir o regar los plantines, previo al trasplante.                                                                           |
|                                                                                   | <b>Flubendiamide **</b>               | <b>SC 48%</b><br>30 cc/100 L de agua<br>240 cc/ha                                                                  | 5  | <b>Translaminar. Ingestión sobre larvas.</b><br>Al observar 2 folíolos con daño fresco/planta. Repetir cada 10 días. No realizar más de 2 aplicaciones consecutivas y no más de 4 en el ciclo del cultivo.                                                                                                                               |
|                                                                                   | <b>Lambdacialotrina</b>               | <b>CS 25%</b><br>17 cc/100 L de agua<br><b>CS y EC 5%</b><br>85 cc/100 L de agua                                   | 1  | <b>Cobertura. Con alto poder de volteo. Contacto e ingestión. Sobre huevo, larva y adulto.</b><br>Ante los primeros ataques después del trasplante. Repetir cada 7 - 14 días de acuerdo al grado de infestación y al crecimiento del cultivo.                                                                                            |
| <b>Polilla de la papa</b><br><i>(Phthorimaea operculella)</i>                     | <b>Cipermetrina + Clorpirifos</b>     | <b>EC 5 % + 50 %</b><br>150 cc/100 L de agua                                                                       | 21 | <b>Cobertura. Contacto, ingestión, inhalación, con poder de volteo. Sobre adultos, larvas y huevos.</b><br>De amplio espectro de acción. Aplicar al observar la plaga. Repetir a la 3ª semana y en ataques intensos, cada dos semanas.                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>Deltametrina / Decametrina</b>     | <b>EC 5%</b><br>30 cc/100 L de agua<br><b>EC 10%</b><br>15 cc/100L de agua                                         | 3  | <b>Cobertura. Contacto, ingestión, con alto poder de volteo sobre larvas y adultos.</b><br>De amplio espectro de acción. Aplicar al observar los primeros daños. Repitir cada 10 días.                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>Permetrina</b>                     | <b>EC 38,4%</b><br>30 cc/100 L de agua                                                                             | 1  | <b>Cobertura. Contacto e ingestión, con poder de volteo, sobre larvas y adultos.</b><br>Ante la presencia de larvas sobre las hojas. Repetir a los 15 días.                                                                                                                                                                              |