

Pulgón verde del ciruelo (*Brachycaudus helichrysi*)

Descripción del pulgón

- ✚ Adulto: hembra alada y áptera de forma globosa, con antenas y cola cortas, con un tamaño aproximado de 2 mm de largo. Las aladas poseen cabeza y tórax negro, y el resto del cuerpo verde. Las que no poseen alas son de color verde-amarillento oscuro y los extremos de las patas negras.
- ✚ Huevo: recién colocado es de color verde, luego se torna negro brillante.
- ✚ Ninfa: puede ser de color marrón, amarillo, verde, verde-amarillento.



Forma alada



Forma áptera

Hospederos


- ✚ **Primarios:** principalmente ciruelo europeo y japonés, también almendro y durazno.
- ✚ **Secundarios:** malezas, hortícolas y ornamentales.

Daños

Las hojas se arrugan y manifiestan un enrulado o acartuchado vertical, a lo largo de la nervadura principal. En infestaciones severas pueden causar defoliación.



Ciclo de vida




En las malezas se producen hembras aladas que parten a los cielos dando lugar a hembras sin alas que pueden poner huevos.

También nacen machos alados que se unen a las hembras sin alas, las cuales realizarán sus posturas de huevos y bajo esa forma pasarán el invierno.

Control Biológico

🌱 Coccinélidos, crisopas, microhimenópteros y sírfidos.



Tratamientos fitosanitarios

	Producto y Formulación	Dosis cada 100 l de agua
PRIMAVERA	Imidacloprid 35% SC Clorpirifos 25%	30-50 cc 80-100 cc
P/hembra fundadora y colonias instaladas		
OTOÑO		
P/control áfidos que vuelven al cultivo para oviposición		