

INFORME FITOSANITARIO MAÍZ

Grupo Fitopatología EEA INTA Pergamino

Ing. Agr. Msc. Matías Patore, Nueva Agronomía SA

Ing. Agr. David Melion, AER INTA Bragado

Ings. Agrs. Analía Curti y Pablo Angelotti CBAGro Servicios Agropecuarios



Norte de Bs. As. y Sur de Santa Fe Condiciones sanitarias actuales del cultivo de maíz

Monitoreo del cultivo de maíz entre V6 y R3

Perfil sanitario híbrido - Condiciones ambientales



ROYA

6-8 Horas de mojado(roció)
T frescas 17-25 C
Fechas de siembra tempranas

TIZON

10-12 horas de mojado (lluvia)
T 20-28 C (amplio rango)
Fechas de siembra tardías



Calidad de aplicación -Blanco objetivo- Coadyuvantes


Tipo de fungicidas : mezclas (triazoles+ estrobilurinas)



Roya común del maíz Severidades moderadas -Híbridos susceptibles



Umbrales de control Roya (*)



(*) % de Severidad promedio en hojas de la espiga ,
mas uno y menos uno 3 % = aprox 25 pústulas
o lesiones pequeñas que se unen

Hojas con manchas de color blanco, algunas con halo amarillento de diferente tamaño



En maíces de siembra temprana estas manchitas están
asociadas a derivas de herbicidas y luego
de tormentas con vientos a bacteriosis



Secretaría
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

