

Alternativas para el control químico de RAMA NEGRA en trigo

Dr. (MSCI), Ing. Agr. Horacio A. Acciaresi M.N. (CPIA): 17614-11-01
Ing. Agr. (MSCI), Martín A. Principiano M.N. (CPIA): 18105-80-01



Acción post-emergente sobre la maleza

- Glifosato + HORMONAL (2,4 D; dicamba; picloram; fluroxipir; clopyralid) **EPSPS + Auxinas sintéticas**
- Paraquat **Fotosistema I**
- Saflufenacil **PPO**
- Carfentrazone **PPO**
- Pirafufen **PPO**
- Glufosinato de amonio **Inh. Glut. Sint.**

Mezclas comerciales

- (paraquat + diuron) **Fotosistema I + Fotosistema II**
- (prosulfurón + triasulfurón + dicamba) **Peak Pack ALS + Auxina sintética**
- (clopyralid + MCPA) **Cutail M Auxinas sintéticas**

+ RESIDUAL

- Metsulfurón **ALS**
- (metsulfurón + clorsulfurón) (10 DAS) **ALS**
- Flumioxazín (10 DAS) **ALS**
- Flumioxazín + Piroxazulfone (15 DAS) **PPO + Inh. Div. Cel.**
- Diflufenican (15 DAS) **Inh. Pg. Car. Sin Registro**
- Terbutrina (PSI-PEE) **Fotosistema II**
- (imazapyr + imazapic) **PSI-PEE Trigos CL ALS**

Post-emergencia (POE) del cultivo


- Metsulfurón 8 a 10 g (+ Hormonal: 2,4 D; dicamba, picloram, fluroxipir, clopyralid; MCPA) **ALS (+ Auxina sintética)**
- Mezcla de hormonales **Auxinas sintéticas**
- Metribuzín 300 a 400 cc **Fotosistema II**
- Terbutrina 0,6 a 1,2 litros **Fotosistema II**
- Carfentrazone 30 a 40 cc **PPO**

Mezclas comerciales

- (metsulfurón + clorsulfurón) **Finesse 12 a 15 g ALS**
- (metsulfurón + aminopyralid) **Tronador Xtra 2 bolsas (67 g) c / 12 Has ALS + Auxina sintética**
- (iodosulfurón + mesosulfurón) + metsulfurón **Hussar Plus 220-240 cc + 5 g ALS**
- (iodosulfurón + metsulfurón) **Hussar OD 75 cc + 5 g ALS**
- (prosulfurón + triasulfurón + dicamba) **Peak Pack L 10 g + 10 g + 150 cc (1 pack c / 20 Has) ALS + Auxina sintética**
- pyroxulam (+ metsulfurón) **Merit WG 84 g (+ 6,7 g) ALS**
- (clopyralid + MCPA) **Cutail M 1,25 a 1,35 litros Auxinas sintéticas**

- 2,4 D + dicamba
- 2,4 D + picloram
- MCPA + dicamba
- MCPA + picloram
- MCPA + fluroxipir
- 2,4 D + fluroxipir

- **Cultivo ya encañado**
- Fluroxipir (300 a 600 cc)
- Clopyralid (150 a 250 cc)
- MCPA (1,2 a 1,8 litros)



Adaptado de Slafer & Rawson, 1994

Considerar en post-emergentes el agregado de coadyuvantes (tensioactivos, correctores de pH, entre otros).

Evitar aplicación de herbicidas residuales cuando la cobertura de otras malezas (*Stellaria media*, *Bowlesia incana*, etc.) sea mayor a 60 %. En estos casos separar las aplicaciones.

Considerar en POE

- Aplicar desde 3 hojas hasta fin de macollaje del cultivo.
- La maleza debe tener entre 2 y 4 hojas.
- No aplicar si hay probabilidad de heladas los días previos o posteriores a la aplicación por posible efecto fitotóxico.