

Acción post-emergente sobre la maleza

- Glifosato + HORMONAL (2,4 D; dicamba; picloram; fluroxypir; clopyralid) **EPSPS + Auxinas sintéticas**
- Paraquat **Fotosistema I**
- (paraquat + diurón) **Fotosistema I + Fotosistema II**
- Saflufenacil **PPO**
- Carfentrazone **PPO**
- Piraflufén **PPO**
- Glufosinato de amonio **Inh. Glut. Sint.**

+ RESIDUAL

- Trifluralina 48% (2 a 3 l) **Inh. Div. Cel.**
- Acetoclor 90% (1 l) **Inh. Div. Cel. Sin registro**
- s-metolaclo 96% (1 l) **Inh. Div. Cel. Sin registro**
- Pendimetalín 33% (3 l) **Inh. Div. Cel. Sin registro**
- Clomazone 36% (1,5 l) **Inh. Pig. Car. Sin registro**
- Sulfentrazone 48% (300 cc) **PPO Sin registro**
- Napropamida **Sin marcas comerciales registradas**
- Imazamox **Colzas CL ALS**

Alternativas para el control químico de malezas en COLZA-CANOLA

Dr. (MSci). Ing. Agr. Horacio A. Acciaresi M.N. (CPIA): 17614-11-01
Ing. Agr. (MSci). Martín A. Principiano M.N. (CPIA): 18105-80-01



Post-emergencia (POE) del cultivo

- Graminícidas (FOPs, DIMs) **ACCasa Sin registro**

- Clopyralid 47,5% (100 a 250 cc) **Auxina sintética Sin registro**
- Aminopyralid **Auxina sintética Sin registro**
- Dicamba 57,5% (40 a 80 cc) **Auxina sintética Sin registro**
- Picloram 24% (40 a 80 cc) **Auxina sintética Sin registro**
- Fluroxypir 48% (250 a 350) **Auxina sintética Sin registro**

- Carfentrazone 40% (40 a 50 cc) **PPO Sin registro**
- Imazamox **Colzas CL ALS**


Riesgo fitotóxico

Bajo

Medio

Moderado/Alto

Moderado



Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Considerar en post-emergentes el agregado de coadyuvantes (tensioactivos, correctores de pH, entre otros).

Evitar aplicación de herbicidas residuales cuando la cobertura de otras malezas (*Stellaria media*, *Bowlesia incana*, etc.) sea mayor a 60 %. En estos casos separar las aplicaciones.

Considerar en POE

- Los herbicidas hormonales deben aplicarse exclusivamente durante el periodo de roseta. Plantas estresadas o cercanas a la etapa reproductiva manifiestan síntomas de fitotoxicidad.
- La maleza debe tener entre 2 y 4 hojas.
- No aplicar si hay probabilidad de heladas los días previos o posteriores a la aplicación por posible efecto fitotóxico.