



5° INFORME FITOSANITARIO EN TRIGO Y CEBADA

Norte de Bs. As. y Sur de Santa Fe

Grupo Fitopatología EEA INTA Pergamino
Ing. Agr. Msc. Matías Pastore, Nueva Agronomía SA
Ings. Agrs. Analía Curti y Pablo Angelotti, CBAgro Servicios Agropecuarios
Ing. Agr. David Melión, INTA Bragado
Ing. Agr. Juan José Lanzillotta- Grupo Trigo, EEA INTA Pergamino

ROYAS SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL TRIGO


#CREADAENCOMUNIDAD #REDESSOCIALES



Prevalencia roya amarilla 100 % en variedades susceptibles

Estado fenológico del Trigo actual entre Z37 y Z60
Las hojas y espigas que no estaban expuestos al momento del control en Z32- Z33 no están protegidos

Controlar antes de llegar a la fase exponencial



Patrón de desarrollo epidémico de una enfermedad policíclica del tipo de las royas

Roya amarilla puede infectar severamente espigas

La severidad de roya amarilla afecta el rendimiento, con una pérdida aproximada de 53 kg/ha a 74 kg/ha por cada incremento de 1% de severidad en hoja bandera y hoja bandera menos uno.

RECORDA ROYA AMARILLA SIEMPRE HAY MAS DE LO QUE VES
APLICACIÓN DE FUNGICIDAS CON BAJOS NIVELES DE LA ENFERMEDAD

ROYA AMARILLA CONTROLADA TARDE



Pérdida de área foliar
Roya sistémica



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

