

12 de Enero de 2012

Nicolás Iannone

Sistema de alerta de plagas – Servicio técnico INTA Pergamino

PRIMEROS ATERRIZAJES DE DIATRAEA

**Será mejor prepararse...
para no dejarle la pista libre!!**

MANEJO DE DIATRAEA en Maíz y Sorgo

**Plaga clave en Pisingallo, Colorado, Dulce y maíz Convencional,
así como en cultivos de Sorgo y Caña de Azúcar**

Nuevamente en esta campaña tenemos un retraso generalizado de la aparición de la 2da generación de Diatraea. Este retraso se corresponde con la tardía aparición de la plaga respecto de la época normal de ocurrencia.

Las localidades que inicialmente presentan riesgos de ataque de Diatraea, aunque en su mayoría presenten niveles todavía leves a moderados, son las siguientes: Banderoló, Gral Villegas, Bolivar, Pehuajó, Pergamino, Chacabuco, Rojas, Arteaga, Santa Clara de Buena Vista, San Martín de las Escobas, Las Petacas, Sastre, San Jorge, Rufino, Hughes, Mataldi, Bell Ville, Cruz Alta.

(informaremos nuevas localidades que registren incrementos en los próximos días).

RECORDAR..

Hacer el Monitoreo de posturas en cada lote!

No guiarse por un solo lote, ya que uno de ellos puede tener posturas y otro no. Monitorear todos los lotes.

Esta es una plaga como cualquier otra. Ej: no todos los lotes de soja son atacados por chinches, ni todos los lotes que tengan chinches van a presentar el mismo nivel de ataque o n° de individuos/m.

Hacer el Control a partir del momento que:

la mayoría de las posturas sean Amarillentas-Anaranjadas
(mayoría A-A)

Si en cambio, la mayoría de las posturas son BLANCAS..
NO APLICAR!

y a los 5 a 6 días constatar mediante otro monitoreo del lote
si son mayoría A-A, o todavía no son mayoría por nuevas oviposiciones



Umbrales de acción

U M B R A L E S

Maíz común y Sorgo: 8 - 10 % de plantas con posturas

Maíz pisingallo: 5 % de plantas con posturas

Busca en la Biblioteca de Agroconsultas Online
(www.agroconsultasonline.com.ar)
información que te ayude a manejar esta plaga