

Nicolás Iannone

Sistema de alerta de plagas – Servicio técnico INTA Pergamino

CHINCHES EN SOJA

NO SIGA PERDIENDO KILOS!!
Decidir correctamente.. o perder plata!!

El impacto de hemípteros fitófagos en soja varía mucho según la especie de chinche y el estado reproductivo del cultivo, parámetros biológicos que deben ser claramente considerados en cada lote a la hora de tomar decisiones. A fin de no perder rinde ni dinero, las decisiones deben estar sustentadas en correctos niveles de daño económicos (NDE) que contemplen qué especies de chinches tenemos y cuál es el estado reproductivo en el que se produce el ataque, más allá de otros parámetros como el espaciamiento entre hileras, el destino de la producción, etc.

NO use el **NDE "todo terreno"** (1 Ch./m)

el DAKAR terminó!!
gastará dinero \$, o perderá kilos U\$S,
inútilmente..

NO TODO VALE DOS PESOS...

Cada **especie** de chinches tiene su propio impacto en el Rinde
Cada **estado fenológico** tiene diferente susceptibilidad a chinches
Los distintos **espaciamientos**, también, hacen variar los NDE

Ajustemos las tomas de decisiones

a la situación particular de cada uno (de los lotes..)
según las distintas y muy variadas situaciones!!

Tampoco se esfuerce tratando de "memorizar NDE" de chinches
(si UD quiere, para practicar tenemos la guía telefónica..)

Usemos el "simple ingenio" de tener la tabla de NDE a mano!

Puede descargar la tabla desde la biblioteca de
www.agroconsultasonline.com.ar

Sugerencia

HAGA PLASTIFICAR LA TABLA,
Y DÉJELA EN LA CAMIONETA

la tabla será una "herramienta a mano"

sale dos pesos, pero eso sí...
le hará ganar mucho dinero !!