

SISTEMA DE ALERTAS DE PLAGAS Servicio Técnico - INTA Pergamino

Ing. Agr. Nicolás Iannone

6 de Marzo de 2014

Presencia de chinches en soja



Ajuste las tomas de decisiones a la situación particular de cada lote, según la especie de chinche, el estado reproductivo del cultivo, entre otros parámetros. No pierda kilos, ni plata. Decida correctamente, ya q no todo vale lo mismo. **En promedio, un individuo de la chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii*) produce el doble de daño que uno de la chinche verde (*Nezara viridula*), y al menos 8 veces más que el de la chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus*).**

El impacto de hemípteros fitófagos en soja varía mucho según la especie de chinche y el estado reproductivo del cultivo, parámetros biológicos que deben ser claramente considerados en cada lote a la hora de tomar decisiones. A fin de no perder rinde ni dinero, las decisiones deben estar sustentadas en correctos niveles de daño económicos (NDE) que contemplen: i) qué especies de chinches están presentes, ya que cada una tiene un determinado impacto en el rinde, ii) estado fenológico del cultivo, los cuales presentan diferente susceptibilidad a chinches, iii) otros parámetros como el espaciamiento entre hileras, el destino de la producción, etc.



Dichelops furcatus



Piezodorus guildinii



Nezara viridula

En los siguientes documentos del Ing.Agr. Iannone encontrará más información sobre el tema, incluida una tabla de niveles de acción, según las distintas especies predominantes de chinches en soja, diferentes estados fenológicos del cultivo y espaciamientos entre hileras:

Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus*): Evolución

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=309

Umbral de decisión para el manejo de chinches en soja en relación a la especie plaga y la fenología del cultivo

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=305