

Evaluación de híbridos de Maíz 2013/14: Peso de grano

Elaborado por Agroconsultas Online



Si bien las variaciones en rendimiento de Maíz son explicadas principalmente por cambios en el número de granos por m^2 , las diferencias en peso de grano son cuantitativamente importantes. Por otra parte, la asignación de un peso de grano probable para un determinado híbrido y condiciones del cultivo, resulta un aspecto central a la hora de estimar el rendimiento de un cultivo de Maíz. El presente documento resume datos de peso de grano provenientes de ensayos comparativos de rinde durante la campaña 2013/14. La mayoría de estos datos provienen de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Maíz, la cual es realizada todos los años por INTA y tienen como objetivo evaluar la performance de híbridos en diferentes regiones agroclimáticas de Argentina. A partir de los resultados publicados, se detalla (Tablas 1 a 11) el peso de grano de diferentes híbridos de Maíz, evaluados en localidades de diferentes regiones productivas (Figura 1). Esta información sirve como referencia a la hora de asignar un peso de grano para estimar el rinde del cultivo de maíz. Igualmente, el valor deberá corregirse en más o en menos según las condiciones estimadas de llenado de granos.




Figura 1. Localidades donde se realizaron los ensayos comparativos de rinde de Maíz.

Tabla 1. Peso de grano logrado en Las Breñas, Chaco. Ambiente: siembra tardía (mediados de Enero, 64900 pl.ha⁻¹) en seco.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
ACA	474 VT3P	269
IIACS	INTA 2012	409
Pannar	BG 7049 H	351
Pannar	BG 7053	305
Pioneer	P 30 B 39 HR	309
Pioneer	P 30 B 39 HR	295
Pioneer	P 3115	385
Pioneer	X 18 B 145 H	258
Sursem	SRM 566 MGRR2	339
Sursem	SRM 582 HXRR	317
Syngenta	SYN 138 VIP3	354

Fuente: INTA EEA Las Breñas (Gallego, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=568

Tabla 2. Peso de grano logrado en Manfredi, Córdoba. Ambientes: i) siembra temprana (principios de Octubre, 96000 pl.ha⁻¹) bajo riego, ii) alta tecnología, iii) siembra tardía (mediados de Diciembre, 76000 pl.ha⁻¹) en secano, y iv) siembra de segunda (mediados de Diciembre, 63000 pl.ha⁻¹) en secano.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)			
		Ambiente i)	Ambiente ii)	Ambiente iii)	Ambiente iv)
ACA	ACA 468 MGRR2			269	
ACA	ACA 470 VT3P		308	275	229
ACA	ACA 474 VT3P		319	310	255
ACA	ACA 496 MG			318	268
ACA	ACA 498 MG			337	270
Arvaes	ARV 2155 HX	309		329	287
Bioceres	BIOMAIZ 620 MG		349	340	290
Bioceres	BIOMAIZ 640 BT		250	258	192
Bioceres	BIOMAIZ 650 BT			265	221
Don Mario	DM 2738 MGRR2	335	305	275	
Don Mario	DM 2771 VT3P				346
Dow	120 PW				349
Dow	505 PW	370		317	306
Dow	510 PW	374		393	398
Dow	562 PW				367
Illinois	I 767 MG			397	327
Illinois	I 797 VT3P			397	333
Illinois	I 887 VT3P			253	
KWS	KM 4020 L	313	310	264	218
KWS	KM 4321 GLSTACK	346	366	313	248
KWS	KM 4500 L	387	387	307	306
La Tijereta	LT 621 MGRR2	338	347	355	317
La Tijereta	LT 623 VT3P	324	303	297	253
La Tijereta	LT 626 VT3P	287	292	301	237
Sursem	SRM 553 MG	328		323	308
Sursem	SRM 563 MGRR2	286		299	210
Sursem	SRM 566 MGRR2	369		368	314
Syngenta	NK 900 VIP3	310		263	239
Syngenta	SYN 2736 TD/TG	371	358	363	
Syngenta	SYN 840 TD/TG	333		316	273
Syngenta	SYN 960 TD/TG	362	350		
Syngenta	SYN 969 TD/TG		343	369	
Syngenta	SYN 969 TD/TG		343	369	

Fuente: INTA EEA Manfredi (Ferreira y Piatti, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafoclimáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=570

Tabla 3. Peso de grano logrado en La Paz, Entre Ríos. Ambiente: siembra tardía (principios de Enero, 64000 pl.ha⁻¹) en seco.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
ACA	ACA 470 VT3P	279
ACA	ACA 474 VT3P	273
ACA	ACA 496 MG	266
ACA	ACA 498 MG	271
Cargill	EXP. IV 66	276
Don Mario	DM 2771 VT3P	317
Dow	505 PW	230
Dow	510 PW	290
Dow	562 PW	317
Illinois	I 767 MG	247
Illinois	I 797 VT3P	252
KWS	KM 4020 L	273
KWS	KM 4360 AS-G	323
KWS	KM 4500 L	336
Limagrain	LG 30820 MGRR	229
Nidera	AX 852 HX	302
Pannar	PAN 4842 HR	333
SPS	SPS 2727 TD/TG	298
SPS	SPS 2756 TD Max CL	262
Sursem	SRM 553 MG	265
Sursem	SRM 563 MGRR2	246
Syngenta	NK 840 TD/TG	308
Syngenta	NK 860 TD/TG	314
Syngenta	NK 900 VIP3	329

Fuente: INTA EEA Paraná (Peltzer y Cabada, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=569

Tabla 4. Peso de grano logrado en Paraná, Entre Ríos. Ambientes: i) siembra temprana (fines de Septiembre, 77000 pl.ha⁻¹) en seco, y ii) siembra tardía (fines de Diciembre, 64000 pl.ha⁻¹) en seco.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)	
		Ambiente i)	Ambiente ii)
ACA	ACA 468 MGRR2	170	
ACA	ACA 470 VT3P	227	283
ACA	ACA 474 VT3P	241	
ACA	ACA 474 VT3P		285
ACA	ACA 496 MG		284
ACA	ACA 498 MG	244	265
AGseed	AG 7004 MGRR2	227	
AGseed	AG 9005 BT	231	
AGseed	AG 9009 BT	218	
AGseed	EXP. 7003 MGRR2	205	
Arvaes	ARV 2155 HX	243	
Arvaes	ARV 2183 MGRR2	254	
Arvaes	ARV 2194 HXRR	256	
Bioceres	BIOMAIZ 640 Bt	221	
Bioceres	BIOMAIZ 650 Bt	198	
Cargill	EXP. IV 66	204	239
Don Mario	DM 2738 MGRR2	222	
Don Mario	DM 2741 MGRR2	243	
Don Mario	DM 2771 VT3P	231	197
Dow	505 PW	228	225
Dow	508 PW	240	
Dow	510 PW	274	312
Dow	562 PW		217
Illinois	I 797 VT3P	271	
Illinois	I 767 MG	227	303
Illinois	I 797 VT3P		264
Illinois	I 887 VT3P	222	
KWS	KM 4020 L	285	233
KWS	KM 4360 AS-G	242	288
KWS	KM 4500 L	269	289
Limagrain	LG 30820 MGRR	251	
Limagrain	LG 30820 MGRR		251
Limagrain	LG 30850 RR/Silero	230	
Nidera	7822 TDM	235	
Nidera	AX 852 HX	233	306
Nidera	AX 887 MG	247	

Continuación Tabla 4.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)	
		Ambiente i)	Ambiente ii)
Pannar	PAN 4842 HR		260
Pannar	PAN 4842 HR	243	
Sem West	SW 5148	237	
SPS	SPS 2736 TD/TG	277	
SPS	SPS 2756 TD Max CL		253
SPS	SPS 2866 TD/TG	246	
SPS	SPS 2879 TD/TG	232	
Sursem	SRM 553 MG	252	
Sursem	SRM 553 MG		243
Sursem	SRM 563 MGRR2		243
Sursem	SRM 566 MGRR2	286	
Syngenta	NK 840 TD/TG	264	327
Syngenta	NK 860 TD/TG		261
Syngenta	NK 900 VIP3	253	252
Syngenta	NK 969 TD/TG	242	
Zaccardi	BZ 422 GLR TG Plus	237	
Zaccardi	BZ Doble Tradición MGRR2	256	
Zaccardi	BZ Maxisilo GLR Plus	240	

Fuente: INTA EEA Paraná (Peltzer y Cabada, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=569

Tabla 5. Peso de grano logrado en Villaguay, Entre Ríos. Ambiente: temprana (fines de Septiembre, 77000 pl.ha⁻¹) en seco.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
ACA	ACA 474 VT3P	166
ACA	ACA 468 MGRR2	200
ACA	ACA 470 VT3P	166
ACA	ACA 498 MG	178
AGseed	AG 7004 MGRR2	215
AGseed	AG 9005 BT	176
AGseed	AG 9009 BT	190
AGseed	EXP. 7003 MGRR2	185
Arvaes	ARV 2155 HX	180
Arvaes	ARV 2183 MGRR2	208
Arvaes	ARV 2194 HXRR	160
Bioceres	BIOMAIZ 640 BT	169
Bioceres	BIOMAIZ 650 BT	151
Cargill	EXP. IV 66	163
Don Mario	DM 2738 MGRR2	175
Don Mario	DM 2741 MGRR2	185
Don Mario	DM 2771 VT3P	205
Dow	505 PW	217
Dow	508 PW	221
Dow	510 PW	189
Illinois	I 767 MG	194
Illinois	I 797 VT3P	210
Illinois	I 887 VT3P	182
KWS	KM 4360 AS-G	205
KWS	KM 4020 L	187
KWS	KM 4500 L	229
Limagrain	LG 30850 RR/Silero	196
Limagrain	LG 30820 MGRR	182
Nidera	7822 TDM	205
Nidera	AX 852 HX	187
Nidera	AX 887 MG	212
Pannar	PAN 4842 HR	177
Sem West	SW 5148	154
SPS	SPS 2866 TD/TG	186
SPS	SPS 2879 TD/TG	320
SPS	SPS 2736 TD/TG	226

Continuación Tabla 5.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
Sursem	SRM 553 MG	207
Sursem	SRM 566 MGRR2	196
Syngenta	NK 840 TD/TG	202
Syngenta	NK 900 VIP3	183
Syngenta	NK 969 TD/TG	187
Zaccardi	BZ 422 GLR TG Plus	166
Zaccardi	BZ Doble Tradición MGRR2	214
Zaccardi	BZ Maxisilo GLR Plus	189

Fuente: INTA EEA Paraná (Peltzer y Cabada, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=569

Tabla 6. Peso de grano logrado en Victoria, Entre Ríos. Ambientes: i) siembra temprana (principios de Octubre, 77000 pl.ha⁻¹) en seco, y ii) siembra tardía (fines de Diciembre, 64000 pl.ha⁻¹) en seco.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)	
		Ambiente i)	Ambiente ii)
ACA	ACA 468 MGRR2	323	
ACA	ACA 470 VT3P	275	
ACA	ACA 470 VT3P		239
ACA	ACA 474 VT3P		253
ACA	ACA 474 VT3P	288	
ACA	ACA 496 MG		253
ACA	ACA 498 MG	296	245
AGseed	AG 7004 MGRR2	301	
AGseed	AG 9005 BT	285	
AGseed	AG 9009 BT	260	
AGseed	EXP. 7003 MGRR2	264	
Arvaes	ARV 2155 HX	270	
Arvaes	ARV 2183 MGRR2	321	
Arvaes	ARV 2194 HXRR	276	
Bioceres	BIOMAIZ 640 Bt	269	
Bioceres	BIOMAIZ 650 Bt	259	
Cargill	EXP. IV 66	268	
Cargill	EXP. IV 66		257
Don Mario	DM 2738 MGRR2	293	
Don Mario	DM 2741 MGRR2	283	
Don Mario	DM 2771 VT3P	281	274
Dow	505 PW	325	297
Dow	508 PW	304	
Dow	510 PW	325	328
Dow	562 PW		272
Illinois	I 767 MG	294	334
Illinois	I 797 VT3P	301	327
Illinois	I 887 VT3P	281	
KWS	KM 4020 L	315	277
KWS	KM 4360 AS-G	289	
KWS	KM 4360 AS-G		242
KWS	KM 4500 L	343	302
Limagrain	LG 30820 MGRR	315	257
Limagrain	LG 30850 RR/Silero	272	
Nidera	7822 TDM	316	
Nidera	AX 852 HX	298	267
Nidera	AX 887 MG	286	

Continuación Tabla 6.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)	
		Ambiente i)	Ambiente ii)
Pannar	PAN 4842 HR	269	
Pannar	PAN 4842 HR		279
Sem West	SW 5148	393	
SPS	SPS 2727 TD/TG		257
SPS	SPS 2736 TD/TG	341	
SPS	SPS 2756 TD Max CL		274
SPS	SPS 2866 TD/TG	316	
SPS	SPS 2879 TD/TG	326	
Sursem	SRM 553 MG	307	273
Sursem	SRM 563 MGRR2		225
Sursem	SRM 566 MGRR2	350	
Syngenta	NK 840 TD/TG	321	289
Syngenta	NK 860 TD/TG		296
Syngenta	NK 900 VIP3	293	231
Syngenta	NK 969 TD/TG	309	
Zaccardi	BZ 422 GLR TG Plus	289	
Zaccardi	BZ Doble Tradición MGRR2	312	
Zaccardi	BZ Maxisilo GLR Plus	274	

Fuente: INTA EEA Paraná (Peltzer y Cabada, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=569

Tabla 7. Peso de grano logrado en Gualeguay, Entre Ríos. Ambiente: temprana (principios de Octubre, 77000 pl.ha⁻¹) en secano.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
ACA	ACA 470 VT3P	266
ACA	ACA 474 VT3P	248
ACA	ACA 498 MG	252
ACA	ACA 468 MGRR2	321
AGseed	AG 7004 MGRR2	279
AGseed	AG 9005 BT	246
AGseed	AG 9009 BT	266
AGseed	EXP. 7003 MGRR2	233
Arvales	ARV 2155 HX	261
Arvales	ARV 2183 MGRR2	256
Arvales	ARV 2194 HXRR	300
Bioceres	BIOMAIZ 640 BT	219
Bioceres	BIOMAIZ 650 BT	232
Cargill	EXP. IV 66	255
Don Mario	DM 2738 MGRR2	260
Don Mario	DM 2741 MGRR2	265
Don Mario	DM 2771 VT3P	228
Dow	505 PW	262
Dow	508 PW	243
Dow	510 PW	319
Illinois	I 767 MG	225
Illinois	I 797 VT3P	269
Illinois	I 887 VT3P	240
KWS	KM 4020 L	288
KWS	KM 4360 AS-G	220
Limagrain	LG 30820 MGRR	282
Limagrain	LG 30850 RR/Silero	281
Nidera	7822 TDM	232
Nidera	AX 852 HX	262
Nidera	AX 887 MG	245
Pannar	PAN 4842 HR	221
Sem West	SW 5148	241

Continuación Tabla 7.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
SPS	SPS 2736 TD/TG	302
SPS	SPS 2866 TD/TG	277
SPS	SPS 2879 TD/TG	281
Sursem	SRM 553 MG	262
Sursem	SRM 566 MGRR2	297
Syngenta	K 969 TD TG	254
Syngenta	NK 840 TD/TG	293
Syngenta	NK 900 VIP3	232
Zaccardi	BZ 422 GLR TG Plus	250
Zaccardi	BZ Doble Tradición MGRR2	288
Zaccardi	BZ Maxisilo GLR Plus	254

Fuente: INTA EEA Paraná (Peltzer y Cabada, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=569

Tabla 8. Peso de grano logrado en Oliveros, Santa Fé. Ambientes: i) siembra temprana (fines de Octubre, 77600 pl.ha⁻¹) en secano, y ii) alta tecnología.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)	
		Ambiente i)	Ambiente ii)
ACA	468 MGRR2	345	
ACA	470 VT3P	275	
ACA	496 MG	302	
ACA	498 MG	325	
ACA	ACA 468 MGRR2		262
ACA	ACA 470 VT3P		292
ACA	ACA 474 VT3P	304	326
ACA	ACA 496 MG		320
ACA	ACA 498 MG		321
ACA	ACA 514	263	337
ACA	ACA 530	331	346
Arvales	ARV 2155 HX	255	259
Arvales	ARV 2183 MGRR2	314	
Arvales	ARV 2183 MGRR2		320
Arvales	ARV 2194 HXRR	277	299
Bioceres	BIOMAIZ 640 Bt	271	285
Bioceres	BIOMAIZ 650 BT	287	
Bioceres	BIOMAIZ 650 Bt		283
Dow	505 PW	300	313
Dow	508 PW	313	316
Dow	510 PW		340
Dow	510 PW	328	
Illinois	I 767 MG	334	338
Illinois	I 797 VT3P	309	336
Illinois	I 887 VT3P	296	
Illinois	I 887 VT3P		280
La Tijereta	LT 621 MGRR2	331	358
La Tijereta	LT 623 VT3P	273	282
La Tijereta	LT 626 VT3P	284	319
Morgan	AVALON PW	302	
Morgan	Avalon PW		303
Morgan	Baltos HX	307	314

Continuación Tabla 8.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)	
		Ambiente i)	Ambiente ii)
Nidera	AX 7761 TDM		340
Nidera	AX 7761 TDM	308	
Nidera	Ax 7822 TDMax	320	318
Red Surcos	Exp 589	297	314
Red Surcos	M 5390 Bt	277	287
Rusticana	Exp 15 Bt	266	271
Rusticana	Exp 21 Bt	250	266
Sursem	SRM 566 MGRR2	345	327
Syngenta	NK 840 TD/TG	294	329
Syngenta	NK 969 TD/TG	284	285
Syngenta	SPS 2736 TD/TG	348	
Syngenta	SPS 2736 TD/TG		359
Syngenta	SPS 2866 TD/TG	320	331

Fuente: INTA EEA Oliveros (Ferraguti et al, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=508

Tabla 9. Peso de grano logrado en Venado Tuerto, Santa Fe. Ambiente: siembra temprana (mediados de Octubre, 72900 pl.ha⁻¹) en seco.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
ACA	ACA 468 MGRR2	346
ACA	ACA 470 VT3P	298
ACA	ACA 474 VT3P	312
ACA	ACA 496 MG	307
ACA	ACA 498 MG	332
ACA	ACA 514	312
ACA	ACA 530	340
Arvaes	ARV 2155 HX	285
Arvaes	ARV 2183 MGRR2	325
Arvaes	ARV 2194 HXRR	291
Bioceres	BIOMAIZ 640 Bt	235
Bioceres	BIOMAIZ 650 Bt	261
Dow	505 PW	312
Dow	508 PW	324
Dow	510 PW	349
Illinois	I 767 MG	316
Illinois	I 797 VT3P	333
Illinois	I 887 VT3P	276
La Tijereta	LT 621 MGRR2	329
La Tijereta	LT 623 VT3P	283
La Tijereta	LT 626 VT3P	292
Morgan	Avalon PW	306
Morgan	Baltos HX	323
Nidera	AX 7761 TDM	314
Nidera	AX 7822 TDMAX	333
Red Surcos	Exp 589	290
Red Surcos	M 5390 Bt	263
Rusticana	Exp 15 Bt	252
Rusticana	Exp 21 Bt	241
Sursem	SRM 566 MGRR2	354
Syngenta	NK 840 TD/TG	329
Syngenta	NK 969 TD/TG	309
Syngenta	SPS 2736 TD/TG	327
Syngenta	SPS 2866 TD/TG	327

Fuente: INTA EEA Oliveros (Ferraguti et al, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=508

Tabla 10. Peso de grano logrado en Colón, Buenos Aires. Ambiente: siembra temprana (fines de Septiembre, 80000 pl.ha⁻¹) en secano.

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
ACA	468 MGRR2	343
ACA	470 VT3P	336
ACA	474 VT3P	354
ACA	498 MG	349
Advanta	8112 V3TP	321
AGseed	AG 7004 MGRR2	319
Arvales	ARV 2155 HXRG	279
Arvales	ARV 2183 MGRR2	359
Arvales	ARV 2489 MGRR2	345
Bioceres	BIOMAIZ 620 MG	351
Don Mario	DM 2738 MGRR2	339
Don Mario	DM 2771 VT3P	308
Dow	M 505 PW	329
Dow	M 508 PW	348
Dow	M 510 PW	354
Illinois	I 797 VT3P	347
Illinois	I 887 VT3P	263
La Tijereta	LT 621 VT3P	374
La Tijereta	LT 623 VT3P	314
La Tijereta	LT 626 VT3P	317
Monsanto	AM 7110 MQKZ	336
Monsanto	Dk 692 VT3P	317
Monsanto	DK 7010 VT3P	347
Monsanto	DK 7210 VT3P	324
Monsanto	Dk 7250 VT3P	329
Monsanto	Dk 7310 VT3P	389
Nidera	Ax 7822 TDMax	337
Nidera	Ax 852 MGRR2	379
Nidera	Ax 887 TD/TG	333
Pannar	PAN 4842 HR	345
Pannar	PAN 6607 YR	323
Pioneer	P 1778 YR	376
Pioneer	P 1845 YR	378
Pioneer	P 2069 YR	270
Sursem	SRM 566 MGRR2	345
Syngenta	2727 TDTG	347
Syngenta	2879 TDTG	345
Syngenta	840 TDTG	348
Syngenta	900 Víptera	328
Syngenta	960 TDTG	335

Fuente: INTA EEA Pergamino (Ferraris y Couretot, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=494

Tabla 11. Peso de grano logrado en Bolívar, Buenos Aires. Ambiente: siembra temprana (mediados de Octubre, 71000 pl.ha⁻¹) en seco

Criadero	Híbrido	Peso de grano (mg)
ACA	ACA 468 MGRR2	289
ACA	ACA 470 VT3P	288
ACA	ACA 474 VT3P	297
ACA	ACA 496 MG	257
ACA	ACA 498 MG	276
Arvaes	ARV 2155 HX	261
Arvaes	ARV 2183 MGRR2	264
Arvaes	ARV 2194 HXRR	277
Arvaes	ARV 2310 MGRR	300
Arvaes	ARV 489 Y	285
Dekalb	DK 692 VT3P	272
Dekalb	DK 7210 VT3P	285
Dekalb	DK 7310 VT3P	327
Illinois	I 797 VT3P	296
Illinois	I 887 VT3P	272
Morgan	AVALON PW	263
Pioneer	P 1778 YR	266
Pioneer	P 1845 YR	301
Pioneer	P 2069 YR	258
Sursem	SRM 553 MG	257
Sursem	SRM 563 MGRR2	234
Sursem	SRM 566 MGRR2	291
Syngenta	840 TDTG	261
Syngenta	969 TDTG	306
Syngenta	NK 900 VIP3	244
Syngenta	SPS 2721 TD/TG	278
Syngenta	SPS 2736 TD/TG	283
Syngenta	SPS 2866 TD/TG	289

Fuente: INTA EEA Pergamino - AER Bolívar (Perez y Estelrich, 2014). Más información sobre este ensayo (condiciones edafo-climáticas, rendimiento y caracteres agronómicos) en:

http://www.agroconsultasonline.com.ar/documento.html?op=v&documento_id=571