

SISTEMA DE ALERTAS DE PLAGAS Servicio Técnico - INTA Pergamino
Ing. Agr. Nicolás Iannone

20 y 27 de Marzo de 2017

“Bicho Torito”

Alerta de presencia de “Bicho Torito”, se recomienda revisar aquellos lotes destinados a siembras otoño-invernales de gramíneas forrajeras, trigo y maíz.

Algunos tips al respecto:

- El “Bicho Torito” se queda siempre en su cueva, no sale (a diferencia del grillo subterráneo). Por eso, no hacer aplicaciones de cobertura sobre la superficie del suelo.
- No considerar a las especies de gusanos blancos como si todas tuvieran impacto en la producción (sino solo a las larvas de *D. abderus*, “bicho torito”).
- Las larvas de “Bicho Torito” son fáciles de diferenciar a campo.
- El “bicho torito” en siembra directa se controla con tratamientos de semillas.
- Utilizar alguna técnica de monitoreo que permita estimar la población de larvas de “Bicho Torito”, no tomar decisiones basadas en el “paresómetro”.
- Hacer monitoreo del suelo o monitorear montículos. Si se observan montículos de tierra (metodología rápida y sencilla), chequear si lo que hay se trata de “Bicho Torito ó Grillo Subterráneo”

Los siguientes documentos brindan más información sobre el manejo y control del “Bicho Torito”

http://www.agroconsultasonline.com.ar//documento.html?op=v&documento_id=353

http://www.agroconsultasonline.com.ar//documento.html?op=v&documento_id=590