


TRAMPA DE LUZ: 9° Informe 2019/2020




9° INFORME: Febrero 2020

Captura de adultos en trampa de luz: se observa un pico de medidora, del yuyo colorado y bolillera!!!



Situación de campo:

- Lluvias/Agua en el suelo: esto se tornó extremo, no dan lluvias por 10 días y las sojas, básicamente de segunda están muy sufridas y en pleno déficit hídrico. Las napas continúan en descenso superando los 2 metros en muchos casos.



Realizado por: Ing Agr María del Pilar Aramberri, Leonel Tornotti, Emiliano Righi y Diego H Pérez
 Consultas: 03404-15459836/03404-15492305/03404-15500342

- Sojas: las que están finalizando el ciclo perderán poco rinde en términos generales. La población de chinches creciendo. Terrible invasión de trips que ya disparo varios tratamientos. En sojas de segunda, las mas complicadas por falta de agua, los trips continúan generando perdida de eficiencias fotosintéticas y área foliar. Datos de ensayos de control de trips equipo Idear 2016: T0 testigo, T1-T2-T3 clorfenapir 500-600 y 800 cc/ha y T4 bifentrin + abamectina 70 cc/ha




Tabla 1. Población inicial de trips (promedio de 3 repeticiones) con el cultivo en R5.

	Día de Aplicación
Foliolo superior	8
Foliolo inferior	15
Total	23

Si bien la plaga se encontraba afectando a toda la planta por completo, el mayor número de individuos se observaba en el estrato inferior y este iba descendiendo hacia el estrato superior.

Tabla 2. Población de trips a los 3, 7, 14, 21 días de ser aplicado (promedio de 3 repeticiones).

Trat	3 DDA			7 DDA			14 DDA			21 DDA		
	Foliolo sup.	Foliolo inf.	Total	Foliolo sup.	Foliolo inf.	Total	Foliolo sup.	Foliolo inf.	Total	Foliolo sup.	Foliolo inf.	Total
T0	5	12,6	17,6	6,33	13,33	19,66	4,66	10,33	15	4,66	10,66	15,32
T1	1	0	1	1,66	6,33	8	1,66	3,33	5	3,33	8,66	12
T2	0	0	0	0,66	4	4,66	2,33	4,66	7	2,66	8,33	11
T3	0	0,66	0,66	1	3,66	4,66	1	5	6	2	8	10
T4	0	0	0	1	4,66	5,66	2,33	4	6,33	3	7	10




Grafico 1: Evolución de la población de trips a lo largo del periodo de estudio para el estrato inferior, estrato superior y el total de ambos (promedio de 3 repeticiones).

- Maíz: temprano: cosechándose con buenos rendimientos. Maíz de Dic: la mayoría en llenado de granos y hay lotes en floración. Estos últimos muy sufridos por falta de agua en el suelo.
- Ganadería de carne: los rodeos de cría ya han destetado los terneros cabezas de parición (entre 170 y 200 kg). Se pronostican buenos indicadores de preñez. Los rodeos de invernadas pastoriles en muy buenas ganancias de pesos al igual que los corrales.
- Forrajes y reservas: en muchos casos la oferta forrajera merma considerablemente, se destacan las praderas con achicoria como las de mejor comportamiento. El problema es la siembra tardía de los verdeos de invierno con perfiles secos y falta de humedad de siembra lo que impactara en la productividad de todo el sistema.
- Lechería: las producciones bajaron entre un 20 y 30%. La mayoría de los sistemas con muchas vacas secas y comenzando las pariciones.
- Cultivos de servicios: ya se sembraron gran parte de los mismos, todavía con emergencias desaparejas a causas de pocas precipitaciones. Imágenes de vicia y r Grass emergiendo dentro de cultivos en pie.



Realizado por: Ing Agr María del Pilar Aramberri, Leonel Tornotti, Emiliano Righi y Diego H Pérez
Consultas: 03404-15459836/03404-15492305/03404-15500342