

📍 Av. Roque Sáenz Peña 582

☎ Cel. +54 2478 503409

Gacetilla Informativa N° 1

Trigo 19-20

Ciclos Largos

Se sembraron bajo excelentes condiciones y dentro de la fecha óptima de siembra, lo que posibilitó una adecuada implantación. Actualmente se encuentran en pleno macollaje (Zadoks 2.2 a 2.4).

En las primeras semanas de Julio dadas las intensas heladas ocurridas, se observaron en distintos lotes y con distinto grado de intensidad daños por frío, ocasionando helada en pasto. Los factores que agudizaron estos síntomas fueron; alta cobertura de rastrojo, la posición en el relieve y factores de estrés (anegamiento, deficiencia de fosforo, etc).

En cuanto al panorama sanitario, se detectó muy baja incidencia de Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis*), y se comenzó a visualizar en lotes puntuales la presencia de Roya amarilla (*Puccinia striiformis*). Hace 20 días atrás comenzamos a visualizar pústulas de Roya anaranjada de la hoja (*Puccinia recondita* f. sp. *Tritici*) sobre DM Algarrobo, con niveles iniciales de incidencia entre el 1 y el 5%, virando a los últimos días a valores del 7 al 25% de incidencia.




Ciclos Cortos

Se sembraron bajo buenas condiciones en fechas óptimas para su implantación, y hoy se encuentran entre emergencia e inicio de macollaje (Zadoks 0 a 2.1).

En base a estas observaciones:

- Posible quiebre en la resistencia de la variedad (DM Algarrobo)
- Aparición atípicamente temprana, en estadios previos a encañazón.





📍 Av. Roque Sáenz Peña 582

☎ Cel. +54 2478 503409

- No contamos con umbrales de aplicación previos a encañazón, por lo tanto, debemos adaptarlos.
- Es importante destacar la mayor incidencia de Roya Anaranjada en cercanías a lotes con trigos guachos que actúan como hospedantes y fuentes primario de inóculo. Pudiendo variar los niveles de incidencia de un 10% hasta un 25%. Siendo este factor determinante para el seguimiento de los lotes.
- Es clave para esta enfermedad mantener niveles bajos de inóculo inicial. Ya que el control a la enfermedad lo estaría aportando principalmente el uso de estrobirulinas y/o carboxamidas que actúan en forma preventiva. Los triazoles en general están demostrando un bajo control curativo sobre esta enfermedad.
- Es importante continuar con el monitoreo de enfermedades para no tener sorpresas y tomar correctas decisiones.




Grafico 1. Evolución incidencia Roya Anaranjada de la hoja por variedad.