

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 16/2/2026

No. 700



CHICHARRITA DEL MAÍZ (*Dalbulus maidis*) – NOVEDADES

35° INFORME RED NACIONAL DE MONITOREO *Dalbulus maidis*.

RECOPLICACIÓN PARCIAL REGIÓN CENTRO SUR

De las 105 localidades relevadas, el 96% (101 localidades) presentan cultivo de maíz. En este informe, el 88% no registró detecciones de *D. maidis*, resultado que se mantiene estable respecto del informe anterior y consolida un escenario de marcada estabilidad poblacional en la región. En las localidades con cultivo de maíz, se registraron valores bajos de capturas de *D. maidis* (menos de 0,5 chicharritas/trampa), observándose en esta región un 36% de las localidades con maíces atravesando etapas vegetativas iniciales e intermedias (Figuras 16 y 17).




Figura 16. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 33°, 34° y 35° (presente informe).

ARAÑUELAS EN SOJA

Esta plaga normalmente asociada a situaciones de sequía, se encuentra presente en cultivos de soja de primera y segunda en amplias zonas productivas. El registro de precipitaciones de los últimos días podría mitigar la situación, de cualquier manera, los monitoreos semanales en el cultivo deben continuar. Recordamos que las arañuelas comienzan causando daños en borduras y cabeceras para luego introducirse en todo el lote. Ante las primeras evidencias de ataque y condiciones adversas para el cultivo, sugerimos comenzar con los controles.

Ante cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza.

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

Para envíos por WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326

maximilianospinollo@gmail.com, Instagram @infobichooficial, X @infobichoficial