

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 16/3/2026

No. 702

ARAÑUELA ROJA EN SOJA

Cómo se mencionaba en informes anteriores, los ataques de arañuelas en soja siguen activos desde hace varias semanas en toda la región. La falta de precipitaciones que atravesaron los cultivos, (sobre todo soja de segunda), hace unas semanas provocaron el desarrollo de esta plaga, la cual persiste pese a la mejora en las condiciones de humedad de los últimos días. En la mayoría de los lotes ya se realizaron controles químicos para combatir la plaga, pero se están detectando reinfecciones cada semana, esta situación obliga a monitorear lotes repetidamente en pocos días a fin de tomar decisiones para proteger al cultivo.



Arañuelas (foto AAPPCE)



CHICHARRITA DEL MAÍZ (*Dalbulus maidis*) – NOVEDADES

37° INFORME RED NACIONAL DE MONITOREO *Dalbulus maidis*.

RECOPLICACIÓN PARCIAL REGIÓN CENTRO SUR

De las 104 localidades relevadas, el 97% presentan cultivo de maíz. En este informe, el 80% no registró detecciones de *D. maidis*, observándose un ligero aumento poblacional en la región. Las localidades con mayores capturas correspondieron a **Marcos Juárez (Córdoba)** y **Pergamino (Buenos Aires)** con 58 y 21 **capturas de adultos por trampas** respectivamente. En las localidades con cultivo de maíz, se registraron valores bajos de capturas de *D. maidis* alrededor de **1,5 chicharritas/trampa**, observándose en esta región tan solo un 5% de las localidades con maíces atravesando etapas vegetativas iniciales (Figuras 16 y 17).

Ante cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza.

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

Para envíos por WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326

maximilianospinollo@gmail.com, Instagram @infobichooficial, X @infobichoficial