

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 20/4/2026

No. 704



CHICHARRITA DEL MAÍZ (*Dalbulus maidis*) – NOVEDADES

39° INFORME RED NACIONAL DE MONITOREO *Dalbulus maidis*.

RECOPLICACIÓN PARCIAL REGIÓN CENTRO SUR

De las 104 localidades relevadas, el 88% presentan cultivo de maíz. En el presente informe, el 61% no registró detecciones de *D. maidis*, mientras que se observó un leve incremento poblacional en la región, concentrado en las categorías de 1 a 20 adultos por trampa (30%). Las localidades con mayores capturas correspondieron a **Timbues y Zavalla (Santa Fe)** con **149 y 113 capturas de adultos por trampas** respectivamente. En las localidades con cultivo de maíz, se registraron incrementos en los valores de capturas de *D. maidis* con un promedio de **10,53 chicharritas/trampa (Figuras 11 y 12).**




Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 37°, 38° y 39° (presente informe).

VERDEOS DE INVIERNO - IMPLANTACIÓN

Los verdeos de invierno continúan en período de implantación en varias zonas productivas de Argentina. Es por ello que sugerimos estar atentos al ataque de colonias de pulgones cuando comiencen a emerger dichos verdeos. Es fundamental proteger a las plántulas en esas primeras etapas de crecimiento, las cuales definen habitualmente el éxito del cultivo.

Recordamos que los pulgones se alimentan a través de estiletes bucales con los cuales introducen toxinas que provocan la muerte de los tejidos vegetales dejando manchas amarillas características.

nte cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

Para envíos por WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326

maximilianospinollo@gmail.com, Instagram @infobichooficial, X @infobichoficial