

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 25/5/2026

No. 706

PULGONES EN ALFALFA

Ante posibles ataques de esta plaga en cultivos de alfalfa, sugerimos intensificar los monitoreos en lotes con varios años de pastura, cómo también en los implantados esta campaña, (estos últimos cuentan con mayor riesgo de ataque de la plaga). Los ataques producen retraso en el desarrollo del cultivo y en casos de alta presencia, muerte de plántulas.

Umbral de daño: 10-20% de plantas con síntomas de daño y colonias de 15 a 20 pulgones. Para su control se dispone de varios insecticidas registrados.



Foto. Fava F.D.

NOVEDADES TRAMPA DE LUZ VENADO TUERTO

La actividad de adultos de lepidópteros de hábito nocturno en trampa de luz continúa baja en nuestra zona. Las condiciones de frío actuales, prácticamente impide el vuelo de las poblaciones de adultos. Seguiremos la evolución de las poblaciones (sobre todo orugas cortadoras) en las próximas semanas. *Gentileza ubicación trampa de luz "AFA SCL Venado Tuerto".*



CHICHARRITA DEL MAÍZ (*Dalbulus maidis*) – NOVEDADES

41º INFORME RED NACIONAL DE MONITOREO *Dalbulus maidis*.

RECOPLICACIÓN PARCIAL REGIÓN CENTRO SUR

De las 109 localidades relevadas, el 74% presentaron cultivo de maíz. En el presente informe, el 54% no registró detecciones de *D. maidis*, observándose un ligero incremento de las categorías superior a 100 adultos por trampa (**9%**). Las localidades con mayores capturas correspondieron a **San Luis y Quines (San Luis)** con **571 y 590 capturas de adultos por trampas** respectivamente. En las localidades con cultivo de maíz, se registró incrementos en los valores de capturas de *D. maidis* con de **14,68 a 41,02 chicharritas/trampa** en este monitoreo (**Figuras 11 y 12**).

Ante cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza.

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

Para envíos por WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326

maximilianospinollo@gmail.com, Instagram @infobichooficial, X @infobichoficial