

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 27/7/2026

No. 709

BICHO BOLITA

Se debe tener especial atención con esta plaga dentro de algunas semanas cuando comiencen las siembras de cosecha gruesa, ya que puede estar presente en suelo en determinadas zonas del país, con focos de abundancia según regiones. Sugerimos realizar monitoreos exhaustivos previos a siembras de distintos cultivos y dependiendo de los resultados, avanzar con controles para evitar pérdida de plantas.

Más información sobre la plaga en <https://www.sinavimo.gob.ar/plaga/armadillidium-vulgare>

CHICHARRITA DEL MAÍZ (*Dalbulus maidis*) – NOVEDADES

46° INFORME RED NACIONAL DE MONITOREO *Dalbulus maidis*.

RECOPLICACIÓN PARCIAL REGIÓN CENTRO SUR

De las 94 localidades relevadas, en un 70% no se registró detecciones de *D. maidis* (Figura 11). El 32% de las trampas se encontraban instaladas sobre el cultivo de maíz, observándose la mayor captura en la localidad de **Timbúes (Santa Fe) con 391 capturas de adultos por trampas**. En las localidades monitoreadas con cultivos de maíz, el promedio de capturas de *D. maidis* mostró una disminución respecto del informe previo, descendiendo de **23,93 a 15,59 adultos por trampa (Figura 12)**.

CHINCHE MARRÓN (*Dichelops furcatus*) – MAÍZ TEMPRANO

Alertamos con anticipación sobre esta plaga en especial, ya que evidenció un crecimiento significativo de sus poblaciones en zona núcleo durante los últimos años.

Nos encontramos a pocas semanas del comienzo de siembras de maíz, por ende, se deben tener en cuenta las siguientes observaciones para el manejo de la plaga mencionada. *Dichelops furcatus* provoca daños de importancia de no ser controlada a tiempo en etapas tempranas de crecimiento de la planta de maíz. Para su identificación se debe remover la superficie, mayormente rastros de soja, a los fines de detectar visualmente a la plaga, una vez descubierta su presencia, se pueden realizar controles preventivos previo nacimiento de plántulas de maíz.

Daños que puede provocar la plaga: Crecimiento anormal de plántulas, presencia de macollos y perforaciones asimétricas en las hojas, mermas de rinde a cosecha.

Ante cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza.

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

Para envíos por WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326

maximilianospinollo@gmail.com, Instagram @infobichooficial, X @infobichoficial

