

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 30/3/2026

No. 703



CHICHARRITA DEL MAÍZ (*Dalbulus maidis*) – NOVEDADES

38° INFORME RED NACIONAL DE MONITOREO *Dalbulus maidis*.

RECOPLICACIÓN PARCIAL REGIÓN CENTRO SUR

De las 102 localidades relevadas, el 93% presentan cultivo de maíz. En este informe, el 70% no registró detecciones de *D. maidis* (Figura 11). En las localidades con cultivo de maíz, se registraron valores bajos de capturas de *D. maidis* (**4,93 chicharritas/trampa**), nivel ligeramente superior a observado en el monitoreo anterior (Figura 12). Las localidades con mayores capturas correspondieron a **Zavalla y Timbues (Santa Fe)** con **117 y 114 capturas de adultos por trampas** respectivamente.




Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *Dalbulus maidis* registradas exclusivamente en trampas ubicadas sobre cultivos de maíz en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 36°, 37° y 38° (presente informe).

TRIPS EN ALFALFA

Esta plaga puede causar daños de importancia en cultivos de alfalfa recién implantados en amplias regiones productivas del País, sobre todo en aquellas zonas donde todavía persisten situaciones de sequía. Los trips pueden provocar daños importantes en pasturas base alfalfa en período de implantación, ya que producen daños severos en hojas por medio de su aparato bucal raspador-chupador. Sugerimos monitorear semanalmente lotes con las características descriptas.

nte cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza.

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

Para envíos por WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326

maximilianospinollo@gmail.com, Instagram @infobichooficial, X @infobichoficial