

Maximiliano G. Spinollo

INFOBICHO DEL: 4/5/2026

No. 705

GUSANOS BLANCOS (*Diloboderus abderus*) - TRIGO

Esta plaga, muy común en la región, puede atacar cultivos de trigo en implantación. Para tener una perspectiva de la presencia de la plaga en cada lote destinado a trigo, hay que realizar muestreos previos a siembra en el suelo, que constan de las siguientes prácticas.

Remover el rastrojo, observando orificios característicos de *Diloboderus abderus* en el suelo, los cuales pueden ser de esta campaña o de años anteriores, a partir de ese dato y en el mismo lugar se recomienda efectuar muestreos con pala de punta en áreas de suelo de 0,25m² (50cm o áreas circulares de 56cm de diámetro), hasta 25-30cm de profundidad.

Umbral de daño en trigo: 5-6 larvas por m².



CHICHARRITA DEL MAÍZ (*Dalbulus maidis*) – NOVEDADES

40° INFORME RED NACIONAL DE MONITOREO *Dalbulus maidis*.

RECOPLICACIÓN PARCIAL REGIÓN CENTRO SUR

De las 103 localidades relevadas, el 80% presentaron cultivo de maíz. En el presente informe, el 48% no registró detecciones de *D. maidis*, observándose un ligero incremento de las categorías de 1 a 20 adultos por trampa (39%). Las localidades con mayores capturas correspondieron a **Timbues y Zavalla (Santa Fe)** con **289 y 253 capturas de adultos por trampas** respectivamente. En las localidades con cultivo de maíz, se registró incrementos en los valores de capturas de *D. maidis* con de **14,68 chicharritas/trampa** en este monitoreo (**Figuras 15 y 16**).

Al realizar comparaciones interanuales en Centro Sur, en ambas campañas predominaron ampliamente las capturas bajas durante todo el período. En 2026 se registró un mayor porcentaje de las categorías intermedias en comparación al 2025 (**Figura 17**).

Ante cualquier duda consulte a su Ingeniero Agrónomo asesor de confianza.

Coordinación: Lic. Maximiliano G. Spinollo

Para envíos por WhatsApp escribir al número 03462 – 15672326

maximilianospinollo@gmail.com, Instagram @infobichooficial, X @infobichoficial